Gérer les tétées alternées

Mai 2026

La tétée alternée, c'est quoi ?

La tétée alternée consiste à diviser en deux groupes les porcelets d'une même portée, en leur laissant un accès alterné à la mamelle.

Quel intérêt ?

L'amélioration de la génétique porcine entraîne une augmentation de la prolificité des truies plus rapide que l'augmentation du nombre de tétines. La concurrence à la tétine pour les porcelets est donc en augmentation lors de la mise-bas. La tétée alternée permet de s'assurer que **l'ensemble des porcelets auront eu accès au colostrum.**

Le porcelet naît avec peu de réserves (12 fois moins qu'un être humain par kg de poids vif). Le colostrum lui apporte l'énergie suffisante et permet de le réchauffer plus rapidement.

Le colostrum a également un intérêt majeur pour donner au porcelet une immunité passive, pour éviter par exemple les diarrhées néonatales ou le rouget (protection jusqu'à 5 – 6 mois).

Quand la pratiquer ?

D'une manière générale : **lorsque le nombre de porcelets d'une portée est supérieur au nombre de tétines fonctionnelles** ou lorsque les portées sont très hétérogènes à la naissance.

Les cochettes ont en moyenne 16 tétines fonctionnelles (seules les cochettes à plus de 14 tétines sont sélectionnées comme futures reproductrices). En parallèle, 60% des mises-bas ont 17 porcelets vivants ou plus par portée.



Bonnes pratiques pour la réussir

Objectif : s'assurer que tous les porcelets ont ingéré 250g de colostrum, le plus rapidement possible après la naissance car toutes les 12 heures, la quantité en immunoglobulines du colostrum diminue de moitié.

Au cours de la mise-bas :

- Sécher et mettre sous une lampe 15 à 20 minutes les porcelets juste nés pour améliorer leur vigueur, en particulier les plus petits. Pour cela, les mettre par exemple dans un seau à côté de la case avec une lampe chauffante, puis les remettre à la tétine ;
- Quand le nombre de porcelets dépasse le nombre de tétines fonctionnelles, bloquer les porcelets qui ont le ventre plein (vérification par palpation du ventre) dans le nid sous une lampe chauffante pour permettre aux autres porcelets d'accéder à la mamelle. Les libérer au bout d'1h à 1h30 ;
- Le lendemain ou en fin de journée, lorsque tout le colostrum a été ingéré, équilibrer les portées en fonction du nombre de tétines.

Aurore LATARD-BATON – apprentie CIRHYO

Plus d'information auprès de votre technicien